

Rezepte zum Herstellen von Milchaustauscher für Heim- und Wildtiere

Milchaustauscher für Heimtiere

	Chinchilla	Degu	Frettchen	Kaninchen	Meer-schweinchen	Ratte
Mengenangaben für 100 g verabreichbaren Milchaustauscher	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)
Kätzchen- und Welpenmilch (Pulver)	20	15	23	36	18	26
Lactose (Milchzucker, Pulver)	1	3	3		2	2
Öl, z.B. Maiskeimöl	4	11				2
Quark, Magerstufe					18	
Trinkwasser, handwarm	75	71	74	64	62	70

Milchaustauscher für Wildtiere

	Eich-hörnchen	Fleder-maus I*	Fleder-maus II*	Igel	Reh	Waschbär
Mengenangaben für 100 g verabreichbaren Milchaustauscher	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)
Kätzchen- und Welpenmilch (Pulver)	25	19	32	45	24	12
Kondensmilch, 7,5% Fett	22					
Lactose (Milchzucker, Pulver)		4	3		4	4
Öl, z.B. Maiskeimöl		2	9	8		
Quark, Magerstufe						15
Trinkwasser, handwarm	53	75	56	47	72	69

* I 1.-4. Lebenswoche, II 5.-12- Lebenswoche

Fütterungshinweis:

Durchschnittliche Tagesmenge pro Heim- und Wildtier bei Allein- oder Zufütterung nach Bedarf.

Anzahl der Fütterungen pro Tag in den ersten beiden Lebenswochen alle 2 Stunden, danach mögliche Ausdehnung der Fütterungsintervalle auf 4 bis 5 Stunden.

Bitte beachten Sie, dass die Aufnahmemenge bei Heimtieren und kleinen Wildtieren in der ersten Lebenswoche nur ca. 1 ml pro Fütterung beträgt, was 1 g Körpergewichtszunahme/Welpe nach Fütterung bedeutet. Bei älteren Tieren Fütterungsmenge nach Bedarf bis zur Sättigung steigern.

Bitte orientieren Sie sich für Frettchen und größere Wildtiere wie Reh und Waschbär bei den Aufnahmemengen an den Etikettenangaben für Hundewelpen mit analogem Körpergewicht.